

USO DI MEDICINALI E VACCINAZIONI

CAUSE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE
FANS (Aspirina, Aulin, Moment) altri analgesici e antipiretici (ASA, pirazoloni, paracetamolo-Tachipirina)	Sospensione per 5 giorni dall'ultima somministrazione se in terapia, se occasionale nessuna sospensione.
Assunzione di pillola anticoncezionale	Nessuna sospensione.
Corticosteroidi sistemici	Sospensione per 15 giorni . Con valutazione medico Avis.
Antibiotici, antimicotici, antipsoriasici, antivirali	Sospensione per 15 giorni dall'ultima somministrazione.
Terapia desensibilizzante	Sospensione per 72 ore dall'ultima iniezione.
Vaccini: per influenza, papilloma virus, pertosse, colera, difterite, epatite B, febbre delle montagne rocciose, meningococco, peste, pneumococco, poliomelite (vaccino inattivo potenziato), tetano, febbre tifoide e paratifoide (vaccino orale)	Sospensione per 48 ore .
Vaccino rabbia successivo ad un morso	Sospensione per 1 anno .
Vaccino epatite A	Sospensione per 28 giorni .
Vaccini per morbillo, parotite, poliomelite (vaccino orale), rosolia, TBC, vaiolo – febbre gialla, febbre tifoide e paratifoide (intramuscolo)	Sospensione per 30 giorni .
Immunoglobuline	Sospensione per 4 mesi .
Psicofarmaci: antidepressivi, neurolettici, litio, stabilizzanti dell'umore	Sospensione per 6 mesi dal termine della terapia. Riammissione previa certificazione specialistica. L' uso occasionale , sporadico ed a <u>bassi dosaggi di ansiolitici non controindica la donazione</u> .